

Stage Ornithologique Camargue, Crau, Alpilles – Mai/Juin 2015



Photo : Alain Campo-Paysaa (ACP), Roselière à Héron pourpré, Etangs du Mas d'Agon



ACP, Salins et phare de la Gacholle




ACP, Plaine de la Crau et Alpilles (arrière plan)



ACP, Salins vers le Fangassier



ACP, Etangs en Camargue gardoise



ACP, roseaux dans la brume matinale



ACP, dunes fleuries



Olivier Eyraud (OE), Etang du Fangassier

OLIVIER EYRAUD, Accompagnateur en Montagne, Guide naturaliste

o.eyraud@yahoo.fr www.pulsatille.com

Dimanche 31 mai 2015 : début du séjour en Camargue

Après que le groupe se soit constitué (arrivées en gare SNCF d'Arles et en voitures pour certains autres) et installé confortablement au gîte, une présentation du séjour et les premiers échanges autour d'une collation ont permis de faire connaissance avant de savourer la première sortie de terrain tant attendue.

Déjà depuis le gîte nous avons pu observer un vol de Cigogne blanche et d'Ibis falcinelle ainsi que le Guêpier d'Europe (nicheur à proximité).

En fin d'après-midi, à Méjanes, le groupe observe des Ibis falcinelles, assez nombreux ces dernières années en Camargue. Le chant de la Lusciniole à moustaches a d'abord fait penser à la Rousserolle verderolle qui est pourtant différent, plus varié, avec des pauses dans les phrases (cette dernière espèce n'étant pas présente dans le sud).

Au Mas Neuf, ce sont les Rousserolles effarvates et turdoïdes qui nous enivrent de leur chant (pas faciles elles non plus à distinguer sans habitude ; voir photos). Quelques oiseaux sont visibles ici (Grèbes huppés avec des juvéniles) mais nous décidons de continuer pour le Mas d'Agon qui est prometteur au vu des repérages effectués ces derniers jours.

A peine arrivés, c'est un festival d'oiseaux, une féerie aérienne qui se joue autour de nous avec des vagues d'oiseaux regagnant les dortoirs et qui nous survolent. Le groupe est conquis.


La Sterne pierregarin et hansel (nicheuses en Camargue) et une Sterne caspienne (rare mais régulière, non nicheuse) ainsi que la Glaréole à collier passent assez près pour nous permettre de décrire collectivement les critères d'identification de ces espèces.

De nombreux hérons sont observés au cours de cette fin d'après-midi : Bihoreau gris, Crabier chevelu, Héron gardeboeufs, Aigrette garzette, Grande Aigrette, Héron cendré, Héron pourpré ainsi qu'un mâle de Blongios nain. Pas moins de huit espèces de Hérons pour le premier soir !

Concernant les fauvettes paludicoles, cinq espèces ont été entendues (et observées pour certaines par une partie du groupe) : la Bouscarle de Cetti, La Cisticole des joncs, la Rousserolle effarvate et turdoïde et enfin la Lusciniole à moustaches.




OE, Rousserolle effarvate aérienne




ACP, Rousserolle turdoïde chanteuse



ACP, vol d'Ibis falcinelles et Aigrettes garzettes



ACP, Bihoreau gris en fin de journée



ACP, Chevaux camarguais et Hérons gardeboeufs



ACP, magnifique Héron pourpré au soleil couchant

Remarque : sauf mention particulière (date, lieu), toutes les photos correspondent par défaut aux lieux décrits dans le texte (prises dans le séjour).

Lundi 1^{er} juin 2015 : circuit en Camargue via la Gacholle et Piémanson...

Le départ à 7h40 est déjà tardif mais permet de s'organiser et de récupérer pour certains du voyage de la veille. Nous sommes heureux à la fraîche de nous immerger dans la Camargue profonde.

Au gré de nos arrêts et balades pédestres, nous observons une petite héronnière de Hérons cendrés, le Martin pêcheur, Cochevis huppés, Pipit rousseline et l'Alouette des champs qui a nettement régressé en France ces dernières années mais est encore bien représentée en Camargue.

Nous écoutons et regardons la Fauvette pitchou (rare en Camargue, non nicheuse *a priori*) et la 'star' recherchée, la Fauvette à lunette, petite et assez discrète dans les sansouires (si ce n'est par le chant qui correspond probablement ici à une deuxième ponte, la première ayant déjà eu lieu en avril/mai). Le groupe a pu l'observer au bord de la piste... avec régal !

Côté oiseaux d'eau, citons un groupe d'Huîtrier pie, l'Echasse blanche, l'Avocette élégante, le Gravelot à collier interrompu et le Vanneau huppé (tous nicheurs en Camargue). Pour les oiseaux en halte migratoire, signalons le Grand Gravelot, des Barges à queue noire en compagnie de Pluviers argentés dont un en plumage nuptial (PN) et le Bécasseau minute (un en PN). Quelques autres espèces complètent agréablement la diversité d'espèces observées au cours de cette matinée (Sterne naine, Busard des roseaux, Lorient d'Europe, Bruant des roseaux...).



ACP, Echasse blanche dégingandée



OE, Bécasseau minute, 08/2006, Camargue



OE, Fauvette à lunettes, 05/2009, Plateau de Leucate



ACP, *Stagiaris volatilis* en bord de Rhône

Le pique-nique est pris en bord du Grand Rhône puis après une sieste réparatrice au frais dans notre Mas (il fait très chaud), nous repartons en fin de journée du côté de Saint-Gille dans les parties cultivées non loin du Petit Rhône.

Ici, le Guêpier d'Europe, le Rollier d'Europe, la Huppe fasciée complètent le tableau avec des oiseaux qui se nourrissent. L'Ibis falcinelle se nourrit dans des rizières. Un oiseau porte 2 bagues, une en métal, illisible, et une en plastique dont on a pu déchiffrer l'inscription grâce à Alain, qui a transmis les informations à un membre référent de la LPO Anjou. Il s'avère que l'Ibis provient d'Andalousie : il a été bagué le 24 juillet 2013 dans le parc de Doñana : il est précisé qu'il a été bagué au nid, poussin non volant. Il a donc environ 2 ans. L'Andalousie est en effet grâce au parc de Doñana réputée pour cette espèce qui y est étudiée.




ACP, Ibis falcinelle (individu bagué)



OE, Huppe fasciée nourrissant, 05/2008, Crau



OE, Lézard vert



ACP, Rainette méridionale

Mardi 2 juin 2015 : la plaine steppique de la Crau puis la Camargue gardoise

Nous nous lançons pour la Crau, delta fossile de la Durance. Départ du groupe motivé à 6h30. Depuis le gîte, le matin avant 6h00, le chant enchanteur du Butor étoilé est entendu, sorte de corne de brume de navire fantôme errant au loin sur le Vaccarès.

En Crau nous observons bien sûr l'Outarde canepetière avec des mâles chanteurs que nous localisons souvent à l'oreille avant de pouvoir les suivre aux jumelles et longues-vues. Toutefois à cette période (début juin), la plupart ne chantent déjà plus, alors que lors du repérage deux semaines auparavant les chants étaient plus nombreux.


Les fabuleux Faucons crécerelletes en reproduction nous permettent de distinguer des scolopendres transportés pour nourrir les jeunes au nid. Nous sommes aussi témoins d'un accouplement. Quant on pense qu'en 1983 il ne subsistait plus que deux couples en Crau, que de chemin parcouru.

L'Oedicnème criard complète la liste ainsi que les alouettes : l'Alouette des champs, très présente, l'Alouette calandrelle, en déclin en PACA, et l'Alouette calandre avec des mâles chanteurs, et des individus qui transportent de la nourriture. Pour ces deux dernières espèces devenues très rares en France, la Crau en constitue actuellement leur bastion. Nous suivons les vols du Busard cendré et du Circaète Jean-le-Blanc en chasse.

OLIVIER EYRAUD, Accompagnateur en Montagne, Guide naturaliste
o.eyraud@yahoo.fr www.pulsatille.com



ACP, Plaine de la Crau, Perdrix rouge sur un kern



OE, Outarde canepetière, 05/2007, Vinon-sur-Verdon



OE, Ædicnème criard, 06/2008, Crau



OE, Alouette calandrella, 05/2008, Crau



ACP, Rollier d'Europe, Crau



OE, Alouette calandre, 02/2009, Crau



OE, Faucon crécerellette mâle venant d'offrir une scolopendre à 'sa' femelle, 05/2015, Crau



OE, Faucon crécerellette, 05/2015, Crau

Après cette matinée, un bon repas préparé par Eric est fort apprécié avant la pause puis nous repartons à nouveau, entre 17h et 21h, sur le terrain en Camargue gardoise.

L'objectif était entre-autre de tenter de voir la Talève sultane. Grâce à la concentration du groupe, nous avons pu avec satisfaction observer jusqu'à 4 individus en bord de roselière, dont 2 ensembles. Les Luscinioles à moustache chantent et les Tourterelles des bois, Huppés fasciés et Rolliers d'Europe se laissent observer... Sur l'eau, une femelle de Nette rousse se déplace suivie de ses 8 poussins. Le spectacle sur les grands étangs est magique en fin de journée avec le Héron pourpré, le Bihoreau gris, l'Ibis falcinelle, la Glaréole à collier, la Sterne pierregarin... mais il faut pourtant se résigner et rentrer.



OE Guêpier d'Europe, Vaumeilh (04)



OE, Cisticole des joncs



Catherine Lemonnier (CL), 2 Talèves sultanes et Echasses blanches



OE, Talève sultane, 04/2008, Camargue (même site où nous l'avons à nouveau observé)

Mercredi 3 juin 2015 : la Camargue sauvage côté Gard puis Bouches-du-Rhône

A 5h25, extinction du lampadaire de la rue, déjà la Huppe fasciée chante en cette heure matinale où la fraîcheur se fait sentir. Il ne faudra que 5 minutes d'attente pour entendre le Butor étoilé, général (étoilé) des marais !

Nous nous déplaçons au cours de la matinée dans le secteur de la Tour Carbonnière, Aigue-Morte. Ici les Hérons pourprés sont nombreux. Sur un étang, deux Grèbes huppés portent leurs poussins sur le dos. Le calme est rompu par 8 sangliers adultes suivis d'un jeune qui traversent rapidement l'étang avant de disparaître à nouveau dans la roselière. Les appareils photo crépitent, la scène est immortalisée.


C'est un régal de se familiariser avec les Laridés : les mouettes (Mouette mélanocéphale et rieuse), la Sterne hansel et pierregarin ainsi que la Guifette moustac.

Ici nous avons la chance, grâce à notre discrétion, de rentrer dans l'intimité du Blongios nain (observé chantant dans la longue-vue) ainsi que la Lusciniole à moustache, enfin observée visuellement, autrement qu'uniquement par son chant.

Entre deux chants de Pélodyte ponctué, le Coucou geai passe devant le groupe (le Coucou gris est également observé dans la matinée) et le Martin pêcheur traverse dans le canal juste derrière... nous ne savons plus vers où nous tourner et certains ont le tournis !

Les Hérons observés dans la héronnière mixte sont constitués d'Aigrette garzette, Héron cendré, Bihoreau gris (par exemple, 3 poussins dans un nid) et d'Ibis falcinelle. Le Héron pourpre a été vu à plusieurs reprises plonger dans les roseaux où il a son nid.

Sur le chemin du retour en fin de matinée, nous faisons des haltes appréciées pour regarder les Cigognes blanches au nid (jusqu'à 4 jeunes). Il fait très chaud, il est temps d'aller se restaurer et se reposer à l'ombre.



ACP, Sangliers traversant au petit matin...




ACP, Sterne hansel en chasse



ACP, Cigognes blanches au nid au sommet de leur tour...



ACP, Libellule



ACP, Cigogne blanche en vol



Bernard Collin (BC), Machaon sur roseau

En fin d'après midi, nous prospectons en Camargue centrale. Sur la route, la Glaréole à collier est revue à Romieu. Au Grenouillet puis peu après, depuis la route, quelques rapaces nous survolent dont le Busard des roseaux et 2 Circaètes Jean-le-Blanc. Un autre rapace, le Milan noir, nous a laissé perplexe pour l'identification. Toutefois grâce à la photo prise par Alain, nous notons la tête un peu grisâtre, typique (l'Aigle Botté auquel nous avons pensé a la face contrastée noir / nuque claire ; de plus, ceux qui n'ont pas les feux de position à la base des épaules -attache de l'aile - sont rarissimes). Il s'avère que l'oiseau transportait un micromammifère, vraisemblablement un campagnol (visible sur la photo) avant d'aller disparaître en ripisylves du grand Rhône dans les arbres (alimentation à l'aire).

La Fauvette mélanocéphale et l'Hypolaïs polyglotte se laissent généreusement entendre. La Fauvette grisette et le Pouillot véloce ont été contactés pour la première fois du séjour ; ils seraient pourtant non nicheurs en Camargue...

Des Cigognes blanches sont de nouveau observées aux nids dans le secteur de la Tour du Valat ; les Spatules blanches se nourrissent frénétiquement au Marais du Verdier.


OLIVIER EYRAUD, Accompagnateur en Montagne, Guide naturaliste
o.eyraud@yahoo.fr www.pulsatille.com




ACP, Cigognes blanches aux nids



OE, Cigogne blanche alimentant les jeunes



ACP, Milan noir avec campagnol allant nourrir à l'aire en ripisylve du Rhône



ACP, Spatules blanches se nourrissant gaiement

Jeudi 4 juin 2015 : les Alpilles, l'Aigle de Bonelli et les passereaux de la garigue

Ce matin est dédié à l'exploration d'une partie du massif des Alpilles dans le secteur d'Aureille. Les oiseaux liés aux falaises et à la garrigue sont visés avec en tête de liste l'Aigle de Bonelli qui niche ici.

Au cours de notre balade nous avons la possibilité d'entendre et de voir les fauvettes locales : Fauvette pitchou, mélanocéphale et passerinette. Le Pipit rousseline a pu être observé dans la longue-vue en activité de chant, depuis son perchoir. Le Tarier pâtre, l'Alouette lulu, le Bruant proyer sont présents ainsi que quelques autres passereaux dont le Pouillot de Bonelli que nous observons pour la première fois du séjour, cette espèce étant absente de Camargue (elle fréquente ici la strate arborée).

Côté macro-insectivores, la Pie-grièche à tête rousse est là : ses principales populations se retrouvent près de la méditerranée et elle se reproduit en juin/juillet après un retour printanier d'Afrique. Nous avons vu la Pie-grièche méridionale - présente uniquement en zone méditerranéenne. Espèce migratrice partielle, ce serait plutôt les femelles qui délaisseraient les territoires en hiver en plaine, contrairement aux mâles.

Au cours de notre matinée, nous avons pu observer le couple d'Aigle de Bonelli dans d'excellentes conditions : à la fois posé sur la falaise et aussi et surtout, en survol, au dessus de nos têtes, prenant des ascendances, chassant dans la garrigue qui nous entoure. Les détails, contrastes de colorations... ont été immortalisés.


Environ 30 couples seulement nichent en France et un Plan National d'Action lui est consacré dans le but de renforcer ses populations en limitant les causes de mortalité notamment.



OE, famille d'Aigle de Bonelli, 07/2006, le Revest-les-Eaux (83)



ACP, Aigle de Bonelli en vol



OE, Pie-grièche à tête rousse



ACP, Coucou gris

En fin de journée, une nouvelle prospection dans le secteur du Mas d'Agon nous replonge dans les espèces locales et les nombreux survols de début de soirée (7 espèces de hérons...). C'est l'occasion de quelques révisions et compléments en prenant le temps d'observer, avant un retour au gîte, puis des échanges autour d'un apéritif particulièrement mérité...

Vendredi 5 juin 2015 : le cœur de la Camargue


Cette matinée nous entraîne dans les prairies humides et salins bordés de salicornes, tamaris et autres espèces qui constituent la Camargue. Le Flamant rose est ici notre point d'orgue car, si nous avons eu déjà à de nombreuses reprises le plaisir toujours renouvelé d'observer des individus porteurs de leurs éclatantes colorations (merci les crevettes !), ici c'est à un spectacle de toute beauté auquel nous assistons.

A travers nos optiques, c'est au niveau de l'îlot du Fangassier que nous pouvons détailler la reproduction de l'unique colonie nicheuse de ce migrateur partiel dont une partie des effectifs se déplace en Afrique du Nord pour y passer l'hiver. De nombreux poussins sont actifs, regroupés en crèche tandis que des femelles ou mâles (incubation à tour de rôle chez les deux partenaires du couple) couvent encore leur unique œuf non loin d'éclore à cette période (ponte en avril et couvaison un mois).


L'îlot a été aménagé en 1970 afin de favoriser la reproduction à l'abri des prédateurs terrestres. Jusqu'à plus de 20 000 couples s'y reproduisent annuellement ! Notons qu'en 2007 l'espèce n'a pas pu nicher, la mise en eau n'ayant pas eu lieu suite à un conflit social au niveau des salins (ici tous les niveaux d'eaux sont régulés par des systèmes complexes de conduits, pompes et vannes).

Plusieurs espèces de limicoles ont été observées et photographiées : Echasse blanche, Avocette élégante, Courlis cendré et Chevalier gambette. Le Grand Gravelot à proximité d'un Gravelot à collier interrompu se nourrissent dans les salins. Ils nous ont permis des comparaisons (tailles relatives, allures, épaisseur/couleur du bec...).


Le Goéland railleur, la Sterne hansel et quelques autres Laridés complètent agréablement les oiseaux ; le minuscule Troglodyte mignon et Merle noir ainsi que le Tarier des prés observés en périphérie constituent les seules mentions du séjour. Notons pour le Tarier des prés qu'il est possible que l'espèce soit nicheuse ici (bien que non mentionnée dans l'atlas des oiseaux nicheurs de PACA et faisant l'objet de rares mentions). Deux individus ont en effet été vus dans un milieu favorable (prairie humide bordée de haies) en période de reproduction (les derniers migrateurs sont théoriquement déjà passés début juin).



ACP, Flamant rose



ACP, vol de Flamants roses



ACP, colonie de Flamants roses



ACP, Goéland railleur



OE, Grand Gravelot




Laurent Sicsic, Gravelot à collier interrompu

En fin de journée nous ne nous laissons pas des passages des hérons et autres larolimicoles du Mas d'Agon. Un Rossignol philomèle observé sous fond de chant de Bouscarle de cetti nous a induit en erreur...



ACP, Rossignol philomèle sous fond de chant de Bouscarle de cetti



ACP, Héron gardeboeufs

Samedi 6 juin 2015 : dernières observations et fin du séjour

Tôt le matin, le Butor étoilé se fait à nouveau entendre ; au cours d'une courte balade à côté du gîte quelques terriers de Guêpier d'Europe sont découverts (des individus chassent à proximité et l'un d'eux a réussi à capturer une libellule). La Fauvette pitchou est à nouveau contactée (chant territorial) pour la deuxième fois du séjour, au cœur de la Camargue (bien qu'elle n'ait pas le statut de nicheuse dans l'Atlas des oiseaux nicheurs de PACA et que les mentions à cette période soient rares).



ACP, l'équipe se restaure et fête un anniversaire...



Michèle Roger, « à table » !



CL, balade ornitho en Camargue gardoise



ACP, observation de l'Aigle de Bonelli



BC, recherche des oiseaux en Crau



BC, observations à la Gacholle



BC, jumelles et longues-vues...



BC, ... une équipe concentrée !



BC, observation de la Talève sultane...



BC, Peter assidu à la prise de notes !

Je tiens, à l'issu de ce premier stage en Camargue/Crau/Alpilles, à vous remercier chaleureusement, chers stagiaires, pour votre motivation et votre implication.

Merci à Eric pour avoir été « aux petits soins » et ses qualités humaines.

A bientôt pour de nouvelles aventures naturalistes... pour un nouvel envol.

Olivier EYRAUD

Accompagnateur en Montagne, Guide nature ornithologue

☎ 06.83.54.81.18

✉ o.eyraud@yahoo.fr

<http://pulsatille.com/>

Pulsatille, Association de tourisme inscrite au registre national ATOUT FRANCE affiliée APRIAM - IM073.100023

Siret : 537.871.758.00018 / APE : 9499Z / TVA : FR13 537871758

Pages suivantes : liste des 117 espèces observées et statuts associés

OLIVIER EYRAUD, Accompagnateur en Montagne, Guide naturaliste

o.eyraud@yahoo.fr www.pulsatille.com

Compte-rendu du stage ornitho PULSATILLE en Camargue, Crau, Alpilles du 31 mai au 06 juin 2015

Nom français	31/05/2015 Méjanès Mas Neuf ; Mas d'Agon ...	01/06/2015 Circuit Camargue via Gachole, Piémanson	01/06/2015 fin PM secteur Petit Rhône, St Gilles	02/06/2015 Plaine de la Crau	02/06/2015 Fin PM, secteur Pont des Tourradons	03/06/2015 Secteur Psalmody	03/06/2015 Fin PM, Grenouillet Verdier...	04/06/2015 Alpilles	04/06/2015 Fin PM, Mas d'Agon	05/06/2015 Vaccarès... Beauduc & Mas d'Agon	06/06/2015 A proximité du gîte	Enjeu de conservation au niveau régional	Vulnérabilité EUROPE	Vulnérabilité PACA	Vulnérabilité FRANCE (nicheur)	Statuts de protection
Grèbe castagneux	6 (Md'A)	x							x			Faible	S	AS	S	PN, BE2
Grèbe huppé	Ad + Juv (Md'A)	x				1c+juv sur dos			x	x		Faible	S	AS	S	PN, BE3
Grand Cormoran		x				x	x		x	x		Faible	S	AS	S	PNR, BE3
Butor étoilé				cht à 6h							1 cht	Fort	DP	D	V	PN, DO1, BO2, BE2
Blongios nain	1M (Md'A)					1M cht &vu						Fort	DP	E	E	PN, DO1, BO2, BE2
Bihoreau gris	x	x			x	3 juv au nid	x		x	x		Faible	S	AS	AS	PN, DO1, BE2
Crabier chevelu	x	x							x	x		Fort	R	AS	V	PN, DO1, BE2
Héron garde-bœufs	xx	xx		x	x	x	x		x	xx		Faible	S	AS	AS	PN, BE2
Aigrette garzette	xx	xx			x	x	x		x	xx		Faible	S	AS	AS	PN, DO1, BE2
Grande Aigrette	xx	x				x			x	x		Modéré	S	E	V	PN, DO1, BE2
Héron cendré	x	xx			x	Héronnière	x		x	xx		Faible	S	-	S	PN, BE3

OLIVIER EYRAUD, Accompagnateur en Montagne, Guide naturaliste
o.eyraud@yahoo.fr www.pulsatille.com

Compte-rendu du stage ornitho PULSATILLE en Camargue, Crau, Alpilles du 31 mai au 06 juin 2015

Héron pourpré	xx	x			x	x	x		xx	xx		Modéré	DP	D	D	PN, DO1, BO2, BE2
Cigogne blanche	1					2 nids occupés	nids occupés		x			Modéré	DP	AS	R	PN, DO1, BO2, BE2
Ibis falcinelle	xx	xx			x	xx	xx		x	xx	x		R	AS	N	PN, DO1, BO2, BE2
Spatule blanche	3 (Md'A)						env 6		x	x		Modéré	R	AS	V	PN, DO1, BO2, BE2
Flamant rose	xx	xx				x	x		x	dont colonie	x	Fort	L	AS	L	PN, DO1, BO2, BE2
Cygne tuberculé	x	x dont famille			x	x	x		x	x (+juv)	x (+juv)	Faible	S	-	R	PN, BO2, BE3
Tadorne de Belon	x	x				x	x			x		Faible	S	AS	S	PN, BO2, BE2
Canard chipeau		x			x							Fort	S	E	V	BO2, BE3
Canard colvert	x	x			x	x	x		x	x		Très faible	S	-	S	BO2, BE3
Nette rousse	x				F+8 cannetons	x			x	x		Fort	S	E	E	BO2, BE3
Milan noir	x	x		x	x	x	x		x	x		Faible	S	AS	AS	PN, DO1, BO2, BE2
Circaète Jean-le-Blanc				1			2					Fort	S	AS	R	PN, DO1, BO2, BE2
Busard des roseaux		M & F					M+F			x		Faible	S	AS	AS	PN, DO1, BO2, BE2
Busard cendré				1M								Faible	S	AS	AS	PN, DO1, BO2, BE2
Buse variable				1	1		x			x		Faible	S	-	S	PN, BO2, BE2
Aigle de Bonelli								1 couple				Très Fort	E	E	E	PN, DO1, BO2, BE2
Faucon crécerellette				colo couv								Très Fort	DP	E	E	PN, DO1, BO1, BE2

OLIVIER EYRAUD, Accompagnateur en Montagne, Guide naturaliste
o.eyraud@yahoo.fr www.pulsatille.com

Compte-rendu du stage ornitho PULSATILLE en Camargue, Crau, Alpilles du 31 mai au 06 juin 2015

				accoupl												
Faucon crécerelle	x	x			x		x	x		x		Faible	D	-	AS	PN, BO2, BE2
Perdrix rouge		x		1 sur Kern								Modéré	D	D	D	BE3
Faisan de Colchide		Fam (poussin)				x	x			x		Très faible	S	-	S	BE3
Gallinule poule-d'eau					x							Très faible	S	-	S	BE3
Talève sultane					4								L	-	V	PN, DO1, BE2
Foulque macroule	x +juv	x			x	x	x			x		Très faible	S	-	S	BO2, BE3
Outarde canepetière				x								Fort	V	E	E	PN, DO1, BE2
Huîtrier pie		10 env										Faible	S	AS	R	BE3
Echasse blanche	xx	x nich				x	x		x	x		Faible	S	AS	AS	PN, DO1, BO2, BE2
Avocette élégante		x								x		Faible	S	AS	L	PN, DO1, BO2, BE2
Oedicnème criard				4								Modéré	V	D	D	PN, DO1, BO2, BE2
Glaréole à collier	1 (chasse Md'A)				2		4 à Romieu					Fort	D	E	E	PN, DO1, BO2, BE2
Grand Gravelot		x								2+		Faible	S	-	V	PN, BO2, BE2
Gravelot à collier interrompu		x								x		Modéré	D	AS	R	PN, BO2, BE2
Pluvier argenté		x dont PN										Faible	S	-	-	BO2, BE3

OLIVIER EYRAUD, Accompagnateur en Montagne, Guide naturaliste
o.eyraud@yahoo.fr www.pulsatille.com

Compte-rendu du stage ornitho PULSATILLE en Camargue, Crau, Alpilles du 31 mai au 06 juin 2015

Vanneau huppé		x				x						Modéré	V	AS	D	BO2, BE3
Bécasseau minute		1 PN										Faible	S	-	-	PN, BO2, BE2
Barge à queue noire		x										Modéré	V	-	V	BO2, BE3
Courlis cendré										2		Modéré	D	-	AS	BO2, BE3
Chevalier gambette										1		Fort	D	E	R	BO2, BE3
Mouette mélanocéphale						2						Modéré	S	AS	R	PN, DO1, BO2, BE2
Mouette rieuse	xx	xx			xx	xx	x		xx	xx	x	Faible	S	D	S	PNR, BE3
Goéland railleur		x								x		Modéré	L	AS	R	PN, DO1, BO2, BE2
Goéland leucophée	x	xx		x	x	x			x	x	x	Très faible	S	-	S	PNR, BE3
Sterne hansel	x					x				x		Fort	R	E	R	PN, DO1, BO2, BE2
Sterne caspienne	1 (Md'A)												R	-	-	PN, DO1, BE2
Sterne pierregarin	x	x			x	x			x	x		Faible	S	AS	S	PN, DO1, BO2, BE2
Sterne naine		x										Modéré	D	AS	R	PN, DO1, BO2, BE2
Guifette moustac						x						Faible	DP	AS	AS	PN, DO1, BE2
Pigeon biset											x	Modéré	S	E	R	BE3
Pigeon biset domestique		x dont tête blanche											-	-	-	

OLIVIER EYRAUD, Accompagnateur en Montagne, Guide naturaliste
o.eyraud@yahoo.fr www.pulsatille.com

Compte-rendu du stage ornitho PULSATILLE en Camargue, Crau, Alpilles du 31 mai au 06 juin 2015

Pigeon ramier		x			x	x	x	x		x	x	Très faible	S	-	SX	
Tourterelle turque	xx	xx			x	x	x			x	x	Très faible	S	-	S	BE3
Tourterelle des bois					1			x		x		Faible	V	AS	D	BE3
Coucou geai						1						Modéré	S	AS	R	PN, BE2
Coucou gris	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	Très faible	D	-	SX	PN, BE3
Martinet noir	x	x		x	x	x		x		x		Très faible	S	AS	S	PN, BE3
Martin-pêcheur d'Europe		1					1					Faible	DP	AS	AS	PN, DO1, BE2
Guêpier d'Europe	x		x			x	x				chasse terriers	Faible	DP	AS	AS	PN, BO2, BE2
Rollier d'Europe			1		4							Modéré	V	AS	R	PN, DO1, BO2, BE2
Huppe fasciée			1	x	x							Modéré	D	D	D	PN, BE2
Pic vert			1									Faible	DP	-	AS	PN, BE2
Alouette calandre				Nourriss								Fort	DP	E	E	PN, DO1, BE2
Alouette calandrelle				x								Modéré	V	D	AS	PN, DO1, BE2
Cochevis huppé		x		x			x			x	x	Modéré	DP	D	D	PN, BE3
Alouette lulu								x				Faible	DP	D	AS	PN, DO1, BE3
Alouette des champs	x	x		xx		x	x			x		Faible	D	AS	AP	BE3

OLIVIER EYRAUD, Accompagnateur en Montagne, Guide naturaliste
o.eyraud@yahoo.fr www.pulsatille.com

Compte-rendu du stage ornitho PULSATILLE en Camargue, Crau, Alpilles du 31 mai au 06 juin 2015

Hirondelle rustique	x	x		x		x	x	x		x	x	Faible	D	D	D	PN, BE2
Hirondelle de fenêtre	nicheur au gîte	x		x							x	Faible	D	AS	SX	PN, BE2
Pipit rousseline		x		x				x		x		Modéré	DP	AS	AS	PN, DO1, BE2
Bergeronnette printanière		x	x				x			x		Très faible	D	-	SX	PN, BE2
Bergeronnette printanière cinereocapilla		x											► sp	► sp	► sp	PN, BE2
Bergeronnette printanière iberiae		x											► sp	► sp	► sp	PN, BE2
Troglodyte mignon										x		Faible	S	-	S	PN, BE2
Rossignol philomèle	xx	x	x	x		x	x		x	x	x	Très faible	S	-	SX	PN, BE2
Rougequeue noir			x									Très faible	S	-	S	PN, BE2
Tarier des prés										2		Modéré	D	D	D	PN, BE2
Tarier pâtre								x				Faible	S	-	AP	PN, BE2
Merle noir										x		Très faible	S	-	SX	BE3
Bouscarle de Cetti	xx	x			x	x	x		x	x	x	Très faible	S	-	S	PN, BO2, BE2
Cisticole des joncs	xx	x			x	x	x		x	x	x	Faible	S	AS	S	PN, BO2, BE2
Lusciniole à moustaches	x chant à Méjanes				x	coche	x			x		Modéré	S	D	R	PN, DO1, BO2, BE2
Rousserolle effarvatte	x								x	x		Très faible	S	-	SX	PN, BO2, BE2

Compte-rendu du stage ornitho PULSATILLE en Camargue, Crau, Alpilles du 31 mai au 06 juin 2015

Rousserolle turdoïde	xx	x			x	x			x	x		Modéré	D	D	D	PN, BO2, BE2
Hypolaïs polyglotte		x					x			x		Très faible	S	AS	S	PN, BO2, BE2
Fauvette pitchou		x						x			x	Faible	DP	AS	AS	PN, DO1, BO2, BE2
Fauvette à lunettes		2										Fort	S	E	V	PN, BO2, BE2
Fauvette passerinette								x		x		Faible	S	AS	SX	PN, BO2, BE2
Fauvette mélanocéphale							x	x		x		Très faible	S	-	S	PN, BO2, BE2
Fauvette grisette							x					Faible	S	D	SX	PN, BO2, BE2
Fauvette à tête noire				x								Très faible	S	-	SX	PN, BO2, BE2
Pouillot de Bonelli								x				Très faible	D	-	SX	PN, BO2, BE2
Pouillot véloce							x					Très faible	S	-	SX	PN, BO2, BE2
Gobemouche gris		x										Faible	D	AS	AS	PN, BO2, BE2
Mésange charbonnière		x			x							Très faible	S	-	SX	PN, BE2
Loriot d'Europe		x										Faible	D	AS	SX	PN, BE2
Pie-grièche méridionale								x				Modéré	► sp	D	V	PN, BE2
Pie-grièche à tête rousse								x				Modéré	D	D	D	PN, BE2
Pie bavarde	x	x		x	x	x	x			x	1 ad harcèle un chat	Très faible	S	-	SX	

OLIVIER EYRAUD, Accompagnateur en Montagne, Guide naturaliste
o.eyraud@yahoo.fr www.pulsatille.com

Compte-rendu du stage ornitho PULSATILLE en Camargue, Crau, Alpilles du 31 mai au 06 juin 2015

Choucas des tours		x	x	x						x		Très faible	S	-	SX	
Corneille noire	x	x		x	x		x	x	x	x		Très faible	S	-	SX	
Etourneau sansonnet	x	x	x	x	x		x	x		x		Faible	D	-	S	
Moineau domestique	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	Faible	D	-	SX	
Moineau friquet											x	Faible	D	AS	AS	PN, BE3
Serin cini	x				x							Très faible	S	-	SX	PN, BE2
Verdier d'Europe	x											Très faible	S	-	SX	PN, BE2
Chardonneret élégant					x					x		Faible	S	-	SX	PN, BE2
Bruant des roseaux		x										Faible	D	-	SX	PN, BE2
Bruant proyer	x	x	x		x	x	x	x		x		Faible	D	AS	SX	PN, BE3

Total espèces 117	48	67	11	28	39	43	45	20	29	62	21
------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Légende :

Statut de conservation

Vulnérabilité Europe (1)	
CR	Critical endangered (Voie d'extinction)
E	Endangered (En danger)
V	Vulnerable (Vulnérable)
DC	Declining (Déclin)
R	Rare (Rare)
DP	Depleted *
L	Localised (Localisé)
S	Secure (non défavorable)

* Depleted : concerne les taxons non rares ou en déclin dans l'UE qui ont subi un déclin modéré ou fort durant les années 1970 à 1990 et dont les effectifs n'ont pas encore retrouvé leur niveau d'avant déclin.

Vulnérabilité France (2)	
DI	Disparu
E	En danger
V	Vulnérable
R	Rare
D	Déclin
L	Localisé
AP	A Préciser
AS	A Surveiller
S	Stable ou en progression
SX	Information insuffisante
NE	Non Evalué
N	Nouvellement installé

Vulnérabilité PACA (3)	
E	En Danger
D	Déclin
AS	A Surveiller

(1) BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004 ; (2) ROCAMORA & YEATMAN-BERTHELOT, 1999 ; (3) LASCÈVE & *al.*, 2006.

Statut de protection

BE2 / BE3 : espèce inscrite à l'annexe II ou III de la **convention de Berne** (1979).

BO2 : espèce inscrite à l'annexe II de la **convention de Bonn** (1979).

DO1 : espèce d'intérêt communautaire, inscrite à l'annexe I de la **directive Oiseaux** CE 79/409.

Protection nationale : liste nationale des Oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain, Arrêté du 16/06/1999 (J.O. du 25/07/1999) modifiant l'arrêté du 17/04/1981.

PN = Espèce Protégée Nationale ; **PR** = Espèce Protégée et Régulable ; **C** = Espèce Chassable.